

Gebruik van Alizin bij konijnen ter afbreking van dracht: veiligheid en welzijnseffecten.

Dit is een samenvatting van een deskundigenverklaring van W.J.R. van der Leij van de Faculteit Utrecht. Voor de volledige informatie verwijzen we naar dat document.

1. Algemene informatie Alizin
 - Werkzame stof: Aglepristone
 - Geproduceerd door: Virbac
 - Productnaam: Alizin

2. Gebruik bij konijnen
 - zie hiervoor: [Özalp et al](#) - verschillende studies

Bij injectie op de 15/16. Dag volgde abortus na gemiddeld 32 uur tot 3 dagen.
Enige genoemde bijwerking was bij sommige konijnen diarree.
Verder werd de methode als toepasbaar beschouwd.

3. Negatief welzijnsaspect
 - bij de foetuses bleef een hartslag hoorbaar

4. Alternatief:
Wordt Aglepristone in een vroeg stadium van de dracht (5. en 6. dag) geïnjecteerd wordt de innesteling van embryo's voorkomen, embryo's worden geabsorbeerd. Injecteren in een latere fase van de dracht kan naast abortus kortdurend tot minder voeropname leiden.
Niet geschikt als preventief middel!

5. Afbreken van de dracht door castratie
Dit vereist ervaring van de veterinaire met castraties bij niet drachtige konijnen!